



La fotja banyuda no té la banda blanquinosa a la part interior de l'ala, que sí presenta la fotja comuna.

Les fotges banyudes alliberades duren un collar, amb un codi de xifres i lletres, que permeten la seva identificació a distància, a més de l'anella metàl·lica corresponent.



Si observeu o trobau algun exemplar portador d'aquestes marques, especialment si és fora del parc de s'Albufera, vos pregam que ho comuniqueu a

### Servei de Protecció d'Espècies

Dir. Gral de Caça, Protecció d'Espècies i Educació Ambiental

Av. Gabriel Alomar, 33. Palma 07006

Tel 971 176800 fax 971 176158

[especies@dgmambie.caib.es](mailto:especies@dgmambie.caib.es)

O a les oficines del parc de s'Albufera (971 892250)

# La fotja banyuda torna a s'Albufera



Ed. Conselleria de Medi Ambient. Impres a Gràfiques Son Espanyollet, gener 2004. Dipòsit legal PM-42-2004

La fotja banyuda (*Fulica cristata*) és una de les espècies més amenaçades d'extinció a Europa. La seva població en aquest continent, fa pocs anys, no superava les 20 parelles, totes a Andalusia, fins que la Generalitat Valenciana va iniciar la seva recuperació, l'any 1999, amb un projecte de categoria, que l'ha recuperada de manera espectacular, gràcies al suport financer de la Unió Europea, amb un programa LIFE. S'ha aconseguit que actualment nidifiqui tant a València com a Catalunya.



A les Balears era present el segle XIX, quan l'ornitòleg Homeyer la va trobar criant al Prat de Sant Jordi. La dessecació de les zones humides, i probablement la pressió de caça, la va extingir de les nostres illes. Ara, gràcies al protocol de col·laboració subscrit recentment entre el Govern de les Illes Balears i la Generalitat Valenciana, recuperam aquesta espècie al parc de s'Albufera, amb l'objectiu que s'hi implanti una població silvestre a partir d'aquelles que s'han criat en captivitat a l'Albufera de València.

La fotja banyuda s'assembla molt a la fotja comuna, amb la qual sovint forma esbarts mixts. Atès que la banyuda és una espècie en perill d'extinció i protegida per la llei, s'ha d'anar molt alerta a confondre-les.



Per diferenciar les dues espècies ens hem de fixar en:

- La fotja banyuda és més llarguera, de coll més alt, i aspecte més rabassut. Quan neda, es pot reparar que la part de darrera és més elevada.



- Les dues protuberàncies rogenques que la banyuda té sobre la placa frontal, molt més desenvolupada en els individus adults i, sobretot, en l'època de zel.

